



DR. ASSASSI

CENTRE DE
CHIRURGIE PLASTIQUE
ET ESTHÉTIQUE



OTOPLASTIE
Correction de l'oreille

VISAGE

Correction des paupières

Lifting du visage

Lifting des sourcils

Otoplastie

Rhinoplastie

Greffes de graisse autologue

SEINS

Augmentation mammaire

Réduction mammaire

Lifting des seins

Poitrine tubulaire

Gynécomastie

CORPS

Liposuccion (WAL/ TLA)

Lipofilling

Abdominoplastie

Bodylift

Operations de Raffermissement

Lipodème

Chirurgie intime

ANTI-VIEILLISSEMENT

Toxine botulique (également pour la migraine/
bruxisme/ hyperhidrose)

L'acide hyaluronique

Needling médical

PRP (traitement sanguin autologue)

Peeling

OTOPLASTIE

Correction de l'oreille

Les malformations les plus fréquentes des oreilles sont les oreilles décollées. Elles sont souvent sujets de moquerie dans notre société et les enfants concernés sont taquinés. Des troubles psychiques peuvent en résulter.

D'ordinaire, les oreilles décollées sont dues à une déformation congénitale du cartilage de l'oreille ou par un développement asymétrique de certaines parties du cartilage. Une opération plastique permet de remodeler le cartilage de l'oreille et de le repositionner correctement. Cette intervention peut être effectuée à tout âge. Vu que la scolarisation constitue un événement important dans la vie d'un enfant, on recommande, pour des raisons psychiques, de procéder à une otoplastie avant l'entrée à l'école.

Une correction individuelle de l'oreille peut aussi être effectuée en cas de difficultés innés ou acquises. Certains patients ne souffrent que d'un décollage vers l'avant de la partie supérieure de l'oreille. D'autre part, de très petites oreilles ou un pli manquant du pavillon de l'oreille peuvent donner lieu à une correction.

La taille de lobes trop grands peut être réduite.

Souvent l'angle entre la tête et l'oreille est trop grand et supérieur à 90 degré lors d'un décollage des oreilles. En outre, le pli principal du pavillon de l'oreille, l'anthélix, est trop faible ou complètement absent.

Une incision située derrière l'oreille permet d'avoir accès au cartilage qui est remodelé et repositionné correctement à l'aide de fils non-dissolubles. La plaie est fermée grâce à une suture de cicatrisation continue, le fil cutané est enlevé après 2 semaines.

A la fin de l'intervention, les patients reçoivent un pansement circulaire de la tête pour 2 jours qui sera remplacé par un bandeau frontal.

Il est indispensable de porter le bandeau frontal afin d'éviter un plissement du pavillon de l'oreille, surtout la nuit. Les oreilles resteront enflées et particulièrement sensibles au toucher les premiers jours après l'intervention.

Quelles sont les complications qui peuvent apparaître ?

Dans de rares cas des complications peuvent se manifester. Des douleurs fortes après l'opération peuvent être un indice pour un bandage trop serré ou un hématome.

Des troubles temporaires de la sensibilité sont tout à fait normaux et se résorberont après quelque temps. La formation de chéloïdes est rare. Il n'y a guère des cas d'infection de la plaie ou du cartilage de l'oreille qui donnent lieu à une guérison tardive.

Un nouveau décollage du pavillon des oreilles est très rare mais peut arriver si les fils se détachent. Ceci peut arriver pendant le sommeil ou si des activités sportives sont reprises trop tôt.

Quels sont les traitements ultérieurs nécessaires ?

Il faudrait porter un bandeau frontal pendant 3-4 semaines après l'opération y compris lors du sommeil.

Les fils seront retirés 15 jours après l'intervention.

De quoi faut-il tenir compte après l'intervention ?

L'incapacité de travail respectivement de scolarisation est d'environ 3 à 4 jours. Il faudrait renoncer à toute pratique sportive pendant 6 semaines.



N'hésitez pas de nous contacter si vous avez des questions

Lors de votre premier rendez-vous, nous allons vous informer de manière détaillée sur l'intervention prévue, les risques impliqués et les éventuelles complications. Nous répondrons volontiers à toutes vos questions.



DR. ASSASSI

CENTRE DE
CHIRURGIE PLASTIQUE
ET ESTHÉTIQUE



71, RUE DES GLACIS
L-1628 LUXEMBOURG-LIMPERTSBERG

TEL.: +352 26 27 02 93

WWW.DR-ASSASSI.LU INFO@DR-ASSASSI.LU